

## INFORMATIONS

### Comment reconnaître la chenille de pyrale du buis ?



#### SON ASPECT

Les chenilles de pyrale du buis (*Cydalina perspectalis*) sont vert clair ornées de stries longitudinales verts foncés, avec des verrues noires. La tête est noire et luisante. Non urticantes, elles mesurent de 3 à 4 cm.



La pyrale du buis est un **papillon nocturne**, mesurant de 3 à 4,5 cm d'envergure, aux ailes blanches et marrons, dont les reflets dorés ou irisés permettent de le distinguer d'autres papillons de nuit, présents en France.



DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
03 86 52 39 06

AUXERRE

DIRECTION DU  
DÉVELOPPEMENT  
DURABLE



LUTTE CONTRE

LA PYRALE

DU BUIS

AUXERRE, LA VILLE POUR TOUS

WWW.AUXERRE.FR



Ville-Auxerre

# LUTTER CONTRE LES CHENILLES DE LA PYRALE DU BUIS

## POURQUOI LUTTER CONTRE LA PYRALE DU BUIS ?

### LA LUTTE CONTRE LA PYRALE DU BUIS EST NÉCESSAIRE



Piège à phéromone

Elle permet de limiter l'expansion de l'espèce et d'éviter les ravages sur les buis et les buxaias qui sont elles aussi menacées.

Les chenilles de pyrale dévorent les buis à un rythme extrêmement rapide empêchant ainsi le bon développement de ceux-ci.

Dans les cas les plus graves les buis sont arrachés et sont remplacés par d'autres végétaux comme des chèvrefeuilles arbustifs (*Lonicera nitida*) ou des fusains (*Euonymus*) arbustes visuellement similaires.

## QUELS DÉGÂTS CAUSENT LA PYRALE DU BUIS ?

### DES ATTAQUES QUI PEUVENT MENER À LA DÉFOLIATION DES ARBUSTES

Les chenilles se nourrissent des feuilles, mais peuvent aller jusqu'à ronger l'écorce en cas de très forte infestation.

Si les symptômes sont discrets en début de saison, les arbustes touchés finissent par présenter un aspect jaunâtre. Les feuilles se dessèchent et les crottes et fils de soie deviennent de plus en plus apparents.

Les attaques peuvent mener à la défoliation complète, voire à la mort de l'arbuste.



## SOYEZ ACTEUR DE LA LUTTE

### MOINEAUX ET MÉSANGES PEUVENT RÉGULER LE NOMBRE DE CHENILLES

Les moineaux et les mésanges peuvent participer à la régulation du nombre de chenilles.

Ces dernières étant prédatrices de larves de papillons, elles participeront à la régulation des chenilles de la pyrale sur le site.

Il est conseillé d'installer des nichoirs en hauteur, afin d'attirer ces oiseaux utiles.

Les chauves-souris participent aussi à la régulation du nombre de papillons de la pyrale du buis.



Pour plus d'informations, se référer à la brochure «*La mésange charbonnière, lutte biologique contre les chenilles*».

### Renseignements :

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter la Direction du Développement Durable à : [sante.hygiene@auxerre.com](mailto:sante.hygiene@auxerre.com) ou au **03 86 52 39 06**.